

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Kiraz, Vişne Şeftali, Kayısı, Nektarin, Erik, Avakado, Kivi	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100 lt su
Bağ	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100 lt su
Zeytin	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100 lt su
Narenciye, Çay, Muz	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100 lt su
Antep fıstığı, Badem Fındık	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	150-300ml/100 lt su
Ispanak, Pırasa, Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Marul Lahana, Enginar, Havuç	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2 uygulama	100-200ml/dekara
Patates, Soğan, Sarımsak Mercimek, Nohut	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2 uygulama	100-200ml/dekara
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Çilek	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2 uygulama	100-200ml/dekara
Kavun, Karpuz	Geç dönemde 10-15 gün ara ile 2 uygulama	100-200ml/dekara
Şeker Pancarı Hayvan Pancarı	4-6 yapraklı devreden itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetçiotu	Gelişme döneminde 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200ml/dekara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Sapa kalkma ve başaklanma döneminde 2 uygulama	100-200ml/dekara

TOPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

Damlama sulama ile 1 lt / dekara dozda uygulama yapılır.
Zamanı yaprakdan uygulama ile aynıdır.

OMEX
AGRIFLUIDS
EC FERTİLİZER

Adept K-33

3 - 0 - 33
NK Gübre Çözeltilisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Azot (N)	w/w	%3
Üre Azotu (N)		%3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)		%33
pH: 11 - 13		

Klor içeriği: < 0,5%

X Tahriş Edici

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz.
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık : 1500 gr
Hacim : 1 litre

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
Şarj No'su :
Lisans No : 564
Tescil No :

DEPOLAMA :

Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK :

Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir.
Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız.
Karıştırmadan emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3 AG İNGİLTERE
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501

İTHALATÇI :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE
İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2
Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17



Piyasa sunacağımız ürünün etiketinin aynısı olacağını taahhüt ederiz.
Aksinin ispatın halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak
cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

sanagro SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE
İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No: 2/1 A Blok K.1 D.2 Bahçelievler-Karşıyaka/İZMİR
Hasan Tahsin V.D. 743 011 9551
Tel: 0232 366 65 22 Faks: 0232 366 65 17
Mersis No: 07420100000000000000