

YAPRAKTAN UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	DOZU
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Nektarin, Erik, Avokado, Kivi	Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama	150-300 ml/100 lt su
Bağ	Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama	150-300 ml/100 lt su
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama	150-300 ml/100 lt su
Naraneşiye, Çay, Muz	Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama	150-300 ml/100 lt su
Anıtep fıstığı, Badem Fındık	Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama	150-300 ml/100 lt su
Isırganak, Pirasa, Karnaviz, Brokoli, Karnabahar, Marul, Lahana, Enginar, Havuç	Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama 15 gün ara ile 2-3 uygulama	100-200 ml/dokara
Patates, Soğan, Sarmısak, Mercimek, Nohut	Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama	100-200 ml/dokara
Domates, Biber, Patlıcan, Fasulye, Bezelye, Kabak, Salatalık	Çiçeklenme öncesi başlayarak 15 gün ara ile 2-3 uygulama	125-200 ml/dokara
Çilek	Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama	100-200 ml/dokara
Kavun, Karpuz	Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1-2 uygulama	100-200 ml/dokara
Şeker Pancarı, Hayvan Pancarı	6 yapraklı dönemde 15 gün ara ile 2 uygulama	100-200 ml/dokara
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer Fıstığı, Ayçiçeği, Tütün, Kolza, Şerbetiğiotlu	Çiçeklenme öncesi ve gelişme döneminde 1 uygulama (Pamukta tarak öncesi)	100-200 ml/dokara
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Mısır	Kardelenme döneminde 1-2 uygulama	100-200 ml/dokara

OMEX
AGRIFLUIDS
EC FERTILIZER

Adept Magnesium

Magnezyum Nitrat Çözeltisi

GARANTİ EDİLEN İÇERİK w/w

Nitrat Azotu (N) %6
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) %9
Suda Çözünür Manganyum (Mn) %1
pH : 4-6

Klor İçeriği : %0.2

UYARILAR

- * Asla uygun doz oranını aşmayınız.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Çocuklardan uzak tutunuz
- * Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.
- * Tıbbi yardım alınız.
- * Yutulması ve tenneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.
- * Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- * Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.
- * Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.
- * Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Net Ağırlık :
Hacim :

Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
Şarj No'su :
Lisans No : 564
Tescil No : 11241

DEPOLAMA :
Depolama sıcaklığı: + 5 / + 40°C olmalıdır.

KARIŞILIRLIK :
Diğer gübre ve tarım ilaçları ile karıştırılabilir.
Fosforik asit ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırmayınız.
Karışımın emin olmak için kavanoz testi uygulayınız.

FİRMA BEYANI:
Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama, hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:
OMEX AGRIFLUIDS LIMITED
Saddlebow Road King's Lynn, Norfolk,
PE 34 3AG ENGLTEREGLAND
Tel : (44)-1553 817 500 Fax: (44)-1553 817 501



İTHALATÇI :
SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE
İLAÇLARI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 A Blok Kat:1 Daire:2
Bahçelievler Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 17

Piyasaya sunacağımız ürünün etkinliğini aynı şekilde ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Aksinihisi tespitli halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

SANAGRO
GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
1671 Sok. No:2/1 E Blok Kat:1 D-2
BAHÇELİEVLER / KARŞIYAKA / İZMİR
Tel: 0 232 366 65 22 Faks: 0 232 366 65 17
Karşıyaka / İZMİR 443 011 95 51

