

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat tarihi ve numarası :

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLAMA SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Bağ	Mildiyö (Plasmopara viticola)	200 ml/100 lt su	14
Domates	Mildiyö (Phytophthora infestans) Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)	200 ml/100 lt su 175 ml/100 lt su	14 14

KULLANMA ŞEKLİ :

İlacın uygulamaya hazırlanması : Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Sonra tavsiye edilen dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapda ön karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısıda çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama esnasında karıştırıcı faal olmalıdır. Hazırlanmış ilaçlı mahlül fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.

Bağ Mildiyösü : 1.İlaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Domates Mildiyösü : Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. 8-10 gün ara ile devam edilir.

Domateste erken yaprak yanıklığı : İlaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanır. iklim koşulları hastalık gelişimi için uygun devam ettiği sürece 8-10 gün ara ile devam edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

HEROCUPER AZUL isimli Bitki koruma Ürünü etki mekanizmasına göre GRUP M olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **HEROCUPER AZUL** un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP M harici) Bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: HEROCUPER AZUL fungisit ve insektisitlerin büyük çoğunluğu ile karışabilir. Kalsiyum içeren ürünler TMTD (Thiram) bazı fungisitler v e DNOÇ içeren ürünlerle karıştırılması tavsiye edilmez. Organik fosforlular ile karışımından hemen sonra kullanılmalıdır.

HEROCUPER AZUL®

Süspansiyon Konsantr (SC)

Litrede 700 gr metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorür

GRUBU M FUNGİSİT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN
UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ
SOLUMAYINIZ.

MASKE , KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİRŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN
VE HAYVAN SOKMAYINIZ.İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI
ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN İLACIN BOŞ AMBALAJINA 1/4 Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK
İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.
BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Ağızda madeni bir lezzet, kanlı ishal, yeşil-mavi renkli kusma ,hızlı soluma, baş dönmesi, heyecan , baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme fazla miktarda alındığında (5-8 gr) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız.Doktor çağırınız. veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürürünüz.İlaç ile temas halinde yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırınız. İlaç göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak gözünüzü suyla en az 15 dakika süreyle yıkayınız. Sulandırılmış ilaç derinize geldiğinde hemen yıkayınız. Elbiselerinize dökülmüş ise hemen değiştirip yıkayınız. Eğer yutulmuş ise hasta baygın değilse hastayı kusturunuz. Baygın hastaya ağızdan hiç bir şey verilmez kusturmaya çalışılmaz.
ANTİDOTU :
Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömürle mide yıkanır. Kan dolaşımına yardım maksadıyla Plazma ve Novadrol tatbik edilir. EDTA veya penisilamine uygulanabilir.

1 Litre

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİNİN (UZEM) 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xn: Zararlı
N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn : Zararlı N:Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Bakıroksiklorür

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

R 22 Yutulması halinde zararlıdır.
R 50/53 Sucul organizmalar için çok zararlı
sucul ortamlarda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S 1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin
S 13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S 24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 29-35 Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. atığını ve kabının güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun kabı veya etiketini gösterin.
S 57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

DEPOLAMA DURUMU :

İlaç orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak kuru havadar ve serin bir yerde, yiyecek ve yemlerden ayrı bir bölümde kilit altında muhafaza edilmelidir. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz. İlaç (serin- kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerinde hoşgörü tolerans sınırlarında bir değişiklik olmaz.

Kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar :

Balıklara zehirlidir. İlaç atıklarını akarsu göl ve havuz sularına bulaştırmayınız.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ.

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.

Üretici Firma :

Herogra Especiales. S.L
Polig. Juncaril, Calle Loja. s/n
18220 Albolote (Granada). Spain

İthalatçı:

Sanagro Gıda Tarım Kimya Haşere
İlaçlama San ve Tic.Ltd.Şti.
1671 Sokak No:2/1 Emin Önal Apt.
A Blok Kat : 1 D:2
35600-Bahçelievler -Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17