

KERB* 50W
Dow AgroSciences

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve No : 30.Mart.1983 - 1574

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Yonca	Küsküt (Cuscuta campestris) (C. Approximata)	300 gr/dekar Yoncalar biçildikten sonra
Şeker Pancarı	Küsküt (Cuscuta campestris) (C. Approximata)	300 - 400 gr/dekar küskütler çimlendikten sonra pancara sarılmadan önce Şeker pancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken

KULLANMA ŞEKLİ

KERB 50 W islanabilir toz formülasyonunda bir ilaçtır. **KERB 50 W** den en iyi sonucu sağlamak için tavsiye dosyasında dekara 60-80 l su kullanılarak alınmalıdır.

Yonca da Küsküt mücadelesinde KERB 50 W , 81 ayri zamanda uygulanabilir.

1) Geç kış ilaçlaması: Yoncanın filizlenmeye başladığı ve yeşil altınını beniz, güldürülen ilacın toprak yüzeyine eği dağılımını önleyecek kadar gelişmişliği dönende yapılan ilaçlamadır. Bu uygulama il bessen bessen Temmuz ortalarına kadar küçük filizlenmesini önlemek amaçlıdır.

2) İl bessen bessen sonra: Ot hasadından bessen sonra yapılacak ilaçlama ile Ağustos ortalarına kadar küçük filizlenmesini önlenmiş olur.

Geç kış ilaçlamasında dekara 40 litre su hasattan bessen sonra bir dekara en az 60 litre su ile artırılması tavsiye edilir. İlaçın uygulanması toprak yüzeyine eği yapılır. Yağmur yağsa veya / veya öretilik karak geçen bir sezonun ardından kullanılmalıdır. **KERB 50 W** den daha iyi bir etki almak için, ilacın kurumasından ardından toprakta hafif bir şekilde (5-10 mm) yığılması önerilir.

İLACIN BAZILANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda KERB 50 W yi bir başka kapta bir miktar suyla iyice karıştırıldıktan sonra depoya eklenir ve karıştırıcı çalışır. Bu ürün kabına ve ilaç ölçme kabına bir miktar su kullanılarak ilaçlama aletinin deposu için yığılır. Karıştırma devasını ederek geriye kalan suyu tüketiriz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: **KERB 50 W** sahip olduğu etki mekanizması nedeniyle **K1 Grubu** bir herbisit olarak sınıflandırılmıştır. Aynı etki mekanizmasını sahip diğer koruma ürünlerinin etkilerinden etkilenen uygulamaları, herbisit organına farklılık gösteren gelişimi tercih etmektedir. Bu nedenle, olası bir direnç gelişimini önlemek için, aynı ilacın sonuna kadar aynı şekilde toplanıp uygulama aşamasını tamamlayınız. Daha fazla uygulamayı gerekli olduğu durumlarda, farklı etki mekanizmasını sahip ürünler (K1 Grubu olmayan) ile döngüsel olarak kullanılmasını öner gösteririz.

KARISILIRLILIĞI

Bu ilaçta karışılabilirlik kullanılmaması tavsiye edilmektedir.



Net Miktar : 800 Gr
Ruhsat Tarihi No : 30.Mart.1983 / 1574
Zararlı Xn
Çevre İçin Tehlikeli N

İçindekiler: Propyramidil
K 40 Kamsorijenik etki için sınırlı delil
R 51/53 Sıcak organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
S 35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S 36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
S 57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- İlaçlama öncesi kalibrasyon yapınız.
- Yabancı ot ilaçları için ayrı bir uygulama alet ve ekipmanı ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalsı, ilaçlama aleti 3 atm den daha düşük basınçla çalıştırılmamalıdır.
- Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.
- Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
- İşliklere zehirli değildir. Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız. Boşaltın ilaç ambalajlarını yasalara göre uygun tavsiyelerle uygun olarak imha ediniz.

İMALATÇISI:

Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionville Road, Indianapolis-46268-1054- INDIANA / ABD.

İTHALATÇI VE SATICI FİRMA:



SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLAMA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
1671 Sokak 2/1 Emin Oyal Apt. A Blok K:1 D:2 BAĞÇELİEVLER-KARŞIYAKA / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 22
Teknik Bilgi için : 0 232 366 65 22 veya 0532 295 13 83

Dow AgroSciences

KERB* 50W

İslenabilir Toz (WP)
Herbit (Dokunma ve İlaç)

GRUBU | K1 | HERBİSİT

Temkili 9500 propyramidil
Kimyasal Adı:

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethylpropyl) benzamide

- ÖNCE ETİKETİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

- EVDE KULLANMAYINIZ.

- ÇOCUKLARDAN VE GİDALardan UZAKTA.

- KAPALI VE KILITLI OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.

- İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENİFFEZ ETMEYİNİZ.

- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN, GÖZ LÜK KULLANINIZ.

- İLAÇLAM ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, SİĞARA

- İÇMEYİNİZ, DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

İLACLANMIŞ SAHAYA 3 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINDA OLUŞABİLECEK RİSKLERDEN KAÇINMAK İÇİN KULLANMA TALİMATLARINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Çilt ve gözde yanma ve tahriş yapabilir.
İLK YARDIM BİLGİLERİ: Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız. Bulguların iritiminin ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz.
Maraz kalanın bilinen yerinde değilse veya spazm ortaya çıkmışsa sıvı vermeyin veya kusturmayın.
Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktor çağırın. Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.
Gözler ile temas etmesi halinde: Su ile birkaç dakika süreyle iyice durulayınız. Bir doktora danışınız.
Deri ile temas etmesi halinde: Hemen eldiveni sabun ve bol su kullanılarak yıkayınız.
Kirlenen giysilerinizi çıkarınız ve tekrar giymeden önce kirlenen giysilerinizi yıkayınız.
Solunması halinde: Hastayı ilacı yerden uzaklaştırın, temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Detaylı bilgi için güvenlik bilgi formuna bakın.

ZEHİRLENME DURUMUN DA , ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)İN 114 NUMARLI TELEFONUNU ARAYINIZ

*Dow AgroSciences firmasının tescilli markasıdır.

Net Miktar : 800 Gr
Azami pakende satış fiyatı :

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

Şeker pancarını takiben, **KERB 50 W** uygulaması alana münavebe bitkisi olarak kışkık tahullar ekilecek ise toprağın en az 15 cm derinlikte sürülmesine dikkat ediniz.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

- Diğer ilaçlar, gübreler ve tohumlar ile gıda ve yem maddelerinden ayrı olarak, çocukların ve/veya hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- Serin, kuru, iyi havalandırılan ve güneş görmeyen yerlerde, açılmamış orijinal ambalajında ağız kapalı olarak saklanmalıdır. Normal şartlar altında orijinal ambalajında asgari iki(2) yıl fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI:

Firma, ilacın belirtilen kimyasal bileşime uygun olarak imal edildiğini ve etikette belirtilen şartlar dahilinde kullanılmas halinde, yazılı tavsiyelere uygunluğunu garanti eder. İlaçın yanlış tatbikatından, zamanında kullanılmamasından ve yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, zıyan ve tım sorumluluk kullanma aittir.

İMALATÇISI:

Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionville Road, Indianapolis-46268-1054- INDIANA / ABD.

İTHALATÇI VE SATICI FİRMA:



SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLAMA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
1671 Sokak 2/1 Emin Oyal Apt. A Blok K:1 D:2 BAĞÇELİEVLER-KARŞIYAKA / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Faks : 0 232 366 65 22

Teknik Bilgi için : 0 232 366 65 22