

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE
İLAÇLAMA SAN ve TİC.LTD.ŞTİ.



SHARSATE®

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Sölysyon (SL)

GRUBU	G9	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	----	-----------------------------

Litrede 480 gr. Glyphosate İsoöpropylamine tuzu
(N-(phosphonomethyl) Giycine İsoöpropylamine salt)

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK
KULLANINIZ.

DERİ VE GÖZ İLE TEMASTAN KAÇININIZ.
İLAÇLAMA SİRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ.
SİĞARA İÇMEYİNİZ.

İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN
İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN İLACIN BOŞ AMBALAJINA 1/4 Ü KADAR SU KOYARAK
İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA
BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Halsizlik, hissizlik, mide ağrıları

İLK YARDIM TEDBİRLERİ :

İlaç değen vücut kısımlarını yıkayınız. Özellikle gözleri çok iyi yıkayınız. Eğer ilaç yutulmuşsa hastayı sıcak tuzlu su ile kusturunuz. Doktora gidiniz. İlaç ve etiketini birlikte götürünüz.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR MERKEZİ)

TEL : 114

Net Miktarı : 1lt
Azami perakende satış fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xi : Tahriş edici N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xi



N

İÇİNDEKİLER

Litrede 480 Gram Glyphosate

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMALAR**

R 41 Gözde ciddi hasar riski
R 51/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamlarda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S 36/37/39 Uygun koruyucu elbise ve eldiven giyin, koruyucu gözlük ve maske kullanın.
S 60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin, ettirin.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR :**

* İlaçlı mahlülü öldüreceğiniz yabancı otların üzerine püskürtünüz.
* Çinko ve galvanizli metal kapları ilacın hazırlanmasında kullanmayınız.
* İlacın hazırlanmasında temiz su kullanınız.
* Arılara, kuşlara ve balıklara zehirlidir.
* Boş ambalajları herhangi bir başka bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
* Dondan koruyunuz, serin ve rutubetsiz depolarda saklayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaclarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaclarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

İMALATÇI FİRMA :

SHARDA WORLDWIDE EXPORT PVT.LTD.
Domnic Holm, 25 th Road, Bandra (West) , Mubai
400050, İndia

Tel : 91 22 56 78 28 00

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE
İLAÇLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
1671 Sokak No : 2/1 EMİN ÖNAL Apt. A Blok K:1 D:2
Bahçelievler/Karşıyaka/İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17

İmal tarihi :
Son kullanma tarihi :
Şarj No :
Ruhsat tarihi ve numarası : 10.06.2010 / 7786

Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Turuncgiller, Bağ, Fındık	Tek yıllık dar ve geniş Yapraklı yabancı otlar Yabancı yulaı (<i>Avena sterilis</i>) Yabancı Havuç (<i>Dacus cerota</i>) Kısır Brom (<i>Bromus sterilis</i>) Kuş yemi (<i>Phalaris spp.</i>) Çimensi Mürdümük (<i>Lathyrus nissolia</i>) Ballıbaba (<i>Lemium sp.</i>) Kanarya otu (<i>Snecio vernalis</i>) Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus mysuroides</i>) Yer fesleğeni (<i>Mercurialis annua</i>) Çukurova hardalı (<i>Ochthodium aegygtiacum</i>) Düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Turna gagası (<i>Geranium dissect</i>) Yabancı Fig (<i>Vicia spp.</i>) Kuş Otu (<i>Stellaria media</i>) Yabancı Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Ebegümeci (<i>Melva perviflora</i>) Yabancı yonca (<i>Medicago spp.</i>) Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sütlegen (<i>Euphorbia spp.</i>) Sirken (kazayağı) (<i>Chenopodium album</i>) Bambul otu (<i>Chorophora trintoria</i>) Domuz Pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Zincir Pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (<i>Amaranthus retroleux</i>) Kirpi Darı (yapışkan otu) (<i>Setaria viridis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli Darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Yeşil Horoz İbiği (<i>Amaranthus viridis</i>)	300 ml / da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre (Pamuk ekimi için hazırlanmış sırtlardaki ve sıralardaki yabancı otları pamuk ekiminden önce)
Kara, Demiryolu kenarları, havaalanları, fabrika bahçeleri, tarla kenarları v.s.	Çok Yıllık Yabancı Otlar : Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Köpek Dişi Ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Tarla Sarmasığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) İsrırgan Otu (<i>Urtica diocia</i>) Pelin Otu (<i>Artemesia vulgaris</i>) Kanyaş (Geliç) (<i>Sorghum halepense</i>)	600 ml/da Yabancı otların aktif olarak büyüdüğü çiçeklenme öncesi devre (Pamuk ekimi için hazırlanmış sırtlardaki ve sıralardaki yabancı otları pamuk ekiminden önce ; hububat ekili alanlarda hasattan sonra yeniden sürmüş kamyş vb. çok yıllık yabancı otlara)
Banketler, su ve Drenaj kanalları	Banket üstü ve su üstü Yabancı otlar	1000 ml/da Yabancı otların aktif büyüme devresinde
		1000-1500 ml/da Yabancı otların aktif büyüme devresinde

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI :

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve karıştırıcısı çalıştırılır. Tavsiye edilen dozdaki ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır ve depo su ile doldurulur. Doğrudan yabancı otlara pulverize edilir. En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdüğü zamanda elde edilir. İlaçlı mahlülün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz olgunlaşmamış yeşil kabuğuna pulverize edilmemesine dikkat edilmelidir.
SHARSATE sistemik etkili bir ilaç olduğundan otlara nüfuz edebilmesi için ilaçlamadan sonra en az 4 -5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işleme yapılmamalıdır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda, örneğin yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşılır. Çok rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılmayınz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SHARSATE adlı bitki ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G9 olarak sınıflandırılmış bir Herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için SHARSATE ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G9 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU :

2-4-D Esterli herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.