

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No
Ruhsat tarihi ve numarası :

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arası Süre
Kabakgiller (Kavun)	Külleme (<i>Ertsiphe cichoracearum</i>) (<i>Spherotheche fuliginea</i>)	15 g/100 lt su ilaçlama aralığı 7-10 gün	3
Bağ	Külleme (<i>Uncunule necator</i>)	10 g/100 lt su	35
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	15 g/100 lt su	14
Turunçgil	Alternaria yanıklığı (<i>Alternaria alternat f.sp citri</i>)	20 g/100 lt su	28
Çeltik	Çeltik yanıklığı ı(<i>Pyricularia orycae</i>)	20 g /da	35
Karpuz	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	20 g/da	3
Kayısı	Yaprak delen hastalığı(<i>Coryneum biferinckii</i>)	12,5 g/100 lt su	14

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su içerisine boşaltılır ve ilaç dibe çökene kadar 1-2 dakika bekletilir. Sonra ilaç tamamen eriyene kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suya tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. **Kavun** : İlaçlamaya hastalık görülmeden başlanmalı, hastalığın yoğun olduğu hallerde ilaçlama aralığı 7 güne indirilmelidir. **Bağ** ; 1.İlaçlama Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm boya erişince **2. İlaçlama** : Koruklar saçma iriliği aldığında **3. İlaçlama** : İkinci ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. **Diğer ilaçlamalar** 15 gün arayla tekrarlanmalıdır. Üzümlere ben düşünce ilaçlamalara son verilmelidir. **Elma** : **1.** Çiçek gözleri kabarığı zaman **2.** Pembe çiçek tomurcuğu devresinde **3.** çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce **Diğer ilaçlamalar** iklim hastalık için uygun giderse 10-12 gün arayla tekrarlanmalıdır. **Turunçgil** : İlkbaharda sürgünler yaklaşık 5-10 cm boya ulaştığında ve yeni yapraklarda ilk hastlık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanmalıdır. Gerekirse 12-14 gün arayla ilaçlamaya devam edilir. **Çeltik** : Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hasalık için uygun giderse 10-15 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır. **Karpuz** : Çevrede ilk hastalık belirtilerininm görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 7-10 gün ara ile diğer ilaçlamalar yapılmalıdır. **Kayısıda yaprak delene** karşı : **1. İlaçlamala** sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, **2. ilaçlama** ilkbaharda çiçek tomurcuqları açılmadan çiçek tomurcuğu döneminde 3.ilaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ kılıfı meyvenin ucunu sıyırdığı dönemde yapılmalıdır.

DİKKAT : Dayanıklılık gelişme riskini azaltmak için **SHARTRI** bir sezonda yapılacak toplam ilaçlama sayısının üçte birinden daha fazla sayıda kullanılmamalıdır. Örneğin 6 ilaçlamanın ikisi **SHARTRI** ile diğerleri etki mekanizması farklı ilaçlar l e yapılmalıdır.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU : Yaygın olarak kullanılan fungusitlerin pek çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet **SHARTRI** diğer ilaçlar ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce **SHARTRI** sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer ilaçlar konmalıdır. Şayet karışıma giren ilaçlar suda erir, ambalajda (WSB) ise depoya önce bunlar sonra **SHARTRI** ilave edilmelidir.

Yayıcı yapıştırıcı ve metil parathion terkipli ilaçlarla karıştırmayın.

Bağda, Parathion methyl , Clorpyrifhos ve Cypermethrin terkipli ilaçlarla yapılan karışımlar Yalova incisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde genç yaprak larda hafif yakma yapabilir. **Elmada**, Parathion methyl terkipli ilaçlarla yapılan karışımlar Golden gibi hassas çeşitlerde erken dönemde genç yapraklarda kahverengileşme ve kıvrılmaya neden olur. **DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:SHARTRI** isimli Bitki koruma Ürünü etki mekanizmasına göre **GRUP C 3 11** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **SHARTRI** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (**GRUP C 3 11 harici**) Bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

SANAGRO GIDA TARIM KİMYA HAŞERE İLAÇLAMA SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.



SHARTRI®

FUNGİSİT (Mantar İlacı)
Suda dağılabilen Granül(WG)
% 50 Trifloxystrobin= (E.E)methoxyimino-(2-(1-(trifluoramethyl-phenyl)-ethylideneaminooxy-methyl)-phenyl)-acetic acid methyl ester

GRUBU C 3 11 FUNGİSİT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYNIZ.
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ.
İLAÇLAMA ESNASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ.
SİGAR İÇMEYİNİZ.
DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
İLAÇLAMADAN SONRA İKİ SAAT SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN İLAÇLI SAHAYA GİREMEZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI
ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN İLACIN BOŞ AMBALAJINA 1/4 Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 DEFA TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

İnsanlarda herhangi bir zehirlenme belirtisi kaydedilmemiştir.

İLK YARDIM EDBİRLERİ :

Zehirlenmeden şüpheleniliyor ise derhal işi bırakınız. Doktor çağırınız, İlaç ambalaj ve etketini yanınızda bulundurunuz. Şayet yutulmuş ve hasta baygın değilse kusturunuz. Bolca aktif kömür verip, elirlilere göre tedavi uygulayınız. Hasta baygın ise ağızdan hiç bir şey vermeyiniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. belirtilere göre tedavi yapılır.


ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN (UZEM) 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xi: Zararlı
N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xi : Zararlı N:Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER

Trifloxystrobin , Sodium salt of Alyl Aryl Sulfonate
Çim kili

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

R 43 Cilt ile temasında allerji ypabilir.
R 50/53 Sucul organizmalar için çok toksik
sucul ortamlarda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S 24 Cilt ile temasından sakının.
S 35 Atıklamı ve kaplarını bir biçimde berteraf edin.
S 37 Uygun koruyucu eldiven takın.
S 57 Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap kullanın.

DEPOLAMA DURUMU :

İlaç orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak kuru havadar ve serin bir yerde, yiyecek ve yemlerden nayrı bir bölümde kilit altında muhafaza edilmelidir. Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız. Usulune uygun olarak imha ediniz. **Kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar :** Balıklara zehirlidir. İlaç atıklarını akarsu göl ve havuz sularına bulaştırmayınız.

FİRMA BEYANI :

Kullanıcı imalatının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluk kabul etmez.

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ.

Üretici Firma :

Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd.
Domnic Holm 29 th Road, Bandra (W)
Mumbai 400050 Hindistan

İthalatçı:

Sanagro Gıda Tarım Kimya Haşere İlaçlama San ve Tic.Ltd.Şti.
1671 Sokak No:2/1 Emin Önal Apt.
A Blok Kat : 1 D:2
35600-Bahçelievler -Karşıyaka / İZMİR
Tel : 0 232 366 65 22 Fax : 0 232 366 65 17